

食道内圧トレンド集計結果レポート

検査日 2003/06/06
患者ID *****
検査科
身長 0.0cm

氏名
性別 0
依頼医師名
体重 0.0Kg

読み
年齢
検査者

生年月日
判読者

食道内圧トレンドのステージ集計レポート							
Stage	Time (min)	Base Level	Min Level	Min-Base Level	Area	Area (-)	Area (+)
Wake	19.50	23.55	10.59	-12.96	202.35	74.07	128.28
REM	101.50	33.12	15.51	-17.61	60.96	49.13	11.83
ST1	396.50	32.14	4.62	-27.52	103.43	85.08	18.35
ST2	20.00	24.66	-10.56	-35.22	133.00	111.71	21.29
ST3	2.00	40.23	26.68	-13.55	48.57	36.44	12.13
ST4	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

食道内圧トレンドレポート


検査日 2003/06/06
患者ID *****
検査科
身長 0.0cm

氏名
性別 0
依頼医師名
体重 0.0Kg

読み
年齢
検査者


生年月日
判読者

Hypnogram




Respiratory disorder Trend

Obstruct Central Mix




Pes Trend (Base Level)

Mean Line (2min)




Pes Trend (Min Level)

Mean Line (2min)




Pes Trend (Min-Base Level)

Mean Line (2min)




Pes Trend (Area)

Mean Line (2min)




Pes Trend (Area-)

Mean Line (2min)



Pes Trend (Area+)

Mean Line (2min)



平成 年 月 日 記入者

食道内圧イベント集計結果レポート

検査日 2003/06/06
患者ID *****
検査科
身長 0.0cm

氏名
性別 0
依頼医師名
体重 0.0Kg

読み
年齢
検査者

生年月日
判読者

食道内圧イベント (Total)		520.00min						
		OA(+)	OH(+)	MA(+)	MH(+)	CA(+)	CH(+)	AH(-)
Pes (+)	回数	205	120	2	0	13	0	0
	Index (%TST)	23.65	13.85	0.23	0.00	1.50	0.00	0.00
	持続時間 (sec)	30.3	36.5	33.3		31.7		
	呼吸数	6.03	7.44	6.00		6.46		
	最低圧 (cm)	-47.50	-47.28	-37.22		-57.89		
	最低振幅圧 (cm)	58.53	58.81	44.11		69.13		
	傾き (cm/sec)	-1.0795	-0.7688	-0.9633		-1.3450		
	傾き指数	3.230	2.467	3.706		3.492		
	間隔 (sec)	5.2	5.0	6.2		5.0		
	面積 (ヘースライン以下) (cm*sec)	325.3	409.8	265.6		434.2		
Pes (-)	回数	2	1	0	0	2	0	0
	Index (%TST)	0.23	0.12	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
	持続時間 (sec)	26.6	19.4			16.8		
	面積 (ヘースライン以下) (cm*sec)	40.1	97.0			45.2		

食道内圧イベント (NREM)		418.50min						
		OA(+)	OH(+)	MA(+)	MH(+)	CA(+)	CH(+)	AH(-)
Pes(+)	回数	194	105	2	0	13	0	0
	Index(%TST)	27.81	15.05	0.29	0.00	1.86	0.00	0.00
	持続時間(sec)	30.0	36.5	33.3		31.7		
	呼吸数	5.99	7.34	6.00		6.46		
	最低圧 (cm)	-48.25	-48.26	-37.22		-57.89		
	最低振幅圧 (cm)	59.63	60.05	44.11		69.13		
	傾き (cm/sec)	-1.1036	-0.7687	-0.9633		-1.3450		
	傾き指数	3.245	2.369	3.706		3.492		
	間隔 (sec)	5.1	5.1	6.2		5.0		
	面積 (へ°-スライン以下) (cm*sec)	327.9	419.0	265.6		434.2		
Pes(-)	回数	2	0	0	0	2	0	0
	Index(%TST)	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
	持続時間(sec)	26.6				16.8		
	面積 (へ°-スライン以下) (cm*sec)	40.1				45.2		

食道内圧イベント (REM)		101.50min						
		OA(+)	OH(+)	MA(+)	MH(+)	CA(+)	CH(+)	AH(-)
Pes(+)	回数	9	14	0	0	0	0	0
	Index(%TST)	5.32	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	持続時間(sec)	38.8	37.4					
	呼吸数	7.22	8.29					
	最低圧 (cm)	-37.68	-38.40					
	最低振幅圧 (cm)	42.27	47.85					
	傾き (cm/sec)	-0.6588	-0.7331					
	傾き指数	2.518	3.198					
	間隔 (sec)	5.8	4.6					
	面積 (ベースライン以下) (cm*sec)	315.7	328.5					
Pes(-)	回数	0	1	0	0	0	0	0
	Index(%TST)	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	持続時間(sec)		19.4					
	面積 (ベースライン以下) (cm*sec)		97.0					

平成 年 月 日 記入者

食道内圧イベント計測レポート


検査日 2003/06/06
患者ID *****
検査科
身長 0.0cm

氏名
性別 0
依頼医師名
体重 0.0Kg

読み
年齢
検査者


生年月日
判読者

Hypnogram




Respiratory disorder Trend

Obstruct Central Mix




Pes Event Duration

Pes arousal pre-nadir post-nadir




Pes Count

Pes arousal pre-nadir post-nadir




Pes Nadir Amp

Pes arousal pre-nadir post-nadir




Pes Ratio

Pes arousal pre-nadir post-nadir




Pes Ratio Index

Pes arousal pre-nadir post-nadir



Pes(-) Area

Pes arousal pre-nadir post-nadir



平成 年 月 日 記入者